

Упутства за примену Реликт Органикс® по култури

Главне ратарске културе

Стрна жита: (пшеница, овас, јечам, раж, просо...)

0.3 — 0.4 л/т

Дорада семена реликтом пре сетве. Потрошња радног раствора 10-15 Л/т.

0.3 — 0.4 л/ха

Прскање биљака током интензивног пораста 2 или више пута са размаком од најмање 10-14 дана између третмана. Потрошња радног раствора: 150-300 Л/Ха.

Главне фенофазе: 1) бокорење, 2) класање, 3) формирање листа заставичар. За озиме усева, такође пролећно бокорење.

Најкритичнија фаза биљног развоја је бокорење. У том периоду се одређују носиоци приноса: број продуктивних стабљика, дужина класа, број зрна у класу.

Смањење стреса изазваног хербицидним третманима и временским условима у фази бокорења, због употребе Реликта-Р, доприноси значајном повећању приноса и до 10-15%.

Махунарке: (соја, грашак, сочиво, пасуљ, леблебије...)

0.3 — 0.4 л/т

Дорада семена реликтом пре сетве. Потрошња радног раствора 10-15 Л/Т.

0.2 — 0.3 л/ха

Прскање биљака током интензивног пораста 2 или више пута са размаком од најмање 10-14 дана између третмана. Потрошња радног раствора: 150-300 Л/Ха.

Главне фенофазе: 1) 2-4 права листа, 2) гранање, 3) почетак плодоношења.

Употреба Реликта-Р током предсетвене припреме семена доприноси убрзаном расту и развоју симбиотских азото фиксатора (бактерије).

Значајан допринос у повећању приноса на махунаркама се остварује комбинацијом нашег препарата са хербицидима чиме долази до смањења негативног (стресогеног) ефекта хербицида на пораст усева, смањења синтезе активних материја и смањења хлорозе биљке. Самим тим повећавамо укупну продуктивност биљке. Хлороза лишћа која се понекад примећује повезана је са уништавањем хлорофила.

Купусњаче: (репица, камелина, уљна ротква...)

0.3 — 0.4 л/т

Дорада семена реликтом пре сетве. Потрошња радног раствора 10-20 Л/Т.

0.25 — 0.35 л/ха

Прскање биљака током интензивног пораста 2 или више пута са размаком од најмање 10-14 дана између третмана. Потрошња радног раствора: 150-300 Л/Ха.

Главне фенофазе: 1) 2-4 права листа, 2) формирање лисне розете, 3) формирање махуна.

Подстицање развоја кореновог система садница, истовремено, обезбеђује побољшање исхране биљака у раним фазама развоја. Реликт-Р подстиче клијавост и енергију клијања семена, развој кореновог система биљке и истовремено обезбеђује бољу исхрану биљака у раним фазама развоја.

Прихрана усева купусњаче посебно је важна на пролеће након презимљавања усева где уз употребу нашег препарата биљка брже наставља интензиван развој кореновог система.

Захваљујући активним компонентама препарата и хелатним својствима хуминске и фулвинске киселине, Реликт-Р се савршено комбинује и повећава ефикасност употребе водно растворљивих ђубрива као што су амонијум сулфат, уреа, АН, КАН итд. и побољшава усвајање хранљивих материја из ђубрива.

Хељда

0.3 — 0.4 л/т

Дорада семена реликтом пре сетве. Потрошња радног раствора 10-20 Л/Т.

0.2 — 0.4 л/ха

Прскање биљака током интензивног пораста 2 или више пута са размаком од најмање 10-14 дана између третмана. Потрошња радног раствора: 150-300 Л/Ха.

Главне фенофазе: 1) 2-3 листа, 2) гранање - почетак цветања, 3) почетак формирања плодова.

Значајан допринос развоју биљака хељде је дорада семена пре сетве, која подстиче развој кореновог система и повећава усвајање хранљивих материја (број коренских длачица).

Реликт-Р добро смањује негативан ефекат хербицида на хељду употребом препарата 2, 3 дана након третмана хербицидима.

Сунцокрет

0.3 — 0.4 л/т

Дорада семена реликтом пре сетве. Потрошња радног раствора 10-15 Л/Т.

0.3 — 0.4 л/ха

Прскање биљака током интензивног пораста 2 или више пута са размаком од најмање 10-14 дана између третмана. Потрошња радног раствора: 150-300 Л/Ха.

Главне фенофазе: 1) 1. пар правих листова, 2) 3-4 пара правих листова.

Важно је примењивати заједно са третманима хербицидима. Употреба Реликта-Р заједно са третманима пестицидима повећава принос семена за 5-19% повећањем пречника главе сунцокрета на 9,4% и масе семена у глави за 5,2%-19,1%.

Лан

0.3 — 0.4 л/т

Дорада семена реликтом пре сетве. Потрошња радног раствора 10-15 Л/Т.

0.3 — 0.4 л/ха

Прскање биљака током интензивног пораста 2 или више пута са размаком од најмање 10-14 дана између третмана. Потрошња радног раствора: 150-300 Л/Ха.

Главне фенофазе: 1) фаза „рибља кост“, 2) почетак цветања.

Фолијарна прихрана раствором хумата са уреом у фази „рибље кости“ сматра се прилично ефикасном у узгоју лана. Код хербицидних третмана у овој фази, доза примене хумата је 0,2 Л/Ха + уреа 3-5 кг на 100 литара воде (не препоручује се мање воде).

Кукуруз

0.3 — 0.4 л/т

Дорада семена реликтом пре сетве. Потрошња радног раствора 10-15 Л/Т.

0.3 — 0.4 л/ха

Прскање биљака током интензивног пораста 2 или више пута са размаком од најмање 10-14 дана између третмана. Потрошња радног раствора: 150-300 Л/Ха.

За формирање велике масе биљака, посебно важан период за исхрану је фаза 2-3 листа културе, тада долази до диференцијације приноса кукуруза.

Према спроведеним истраживањима, употреба Реликта-Р у кукурузу доприноси повећању хлорофила у листовима, што сходно томе повећава синтезу суве материје у надземној биомаси, повећавајући тиме његову хранљиву вредност приликом бербе силаже.

Употреба Реликта-Р заједно са хербицидима обезбеђује смањење трајања њиховог токсичног деловања на усев и самим тим повећава принос кукуруза.

Шећерна репа

0.3 — 0.4 л/т

Дорада семена реликтом пре сетве. Потрошња радног раствора 10-20 Л/Т.

0.25 — 0.35 л/ха

Прскање биљака током интензивног пораста 2 или више пута са размаком од најмање 10-14 дана између третмана. Потрошња радног раствора: 150-300 Л/Ха.

Главне фенофазе: 1) 1-2 пара правих листова, 2) 3-4 пара правих листова, 3) фаза формирања розета (почетак затварања редова).

Најважнији период у животу репе сматра се првим делом вегетације, пре него што се редови затворе. Конкретно, то је период у коме се формира потенцијал приноса репе у наредном периоду. С тим у вези, током наведеног периода, неопходно је обезбедити минимални стресни ефекат на биљке неповољних фактора услед комбиноване примене Реликта-Р са хербицидима и ђубривима.

Црвени мак

0.3 — 0.4 л/т

Дорада семена реликтом пре сетве. Потрошња радног раствора 10-20 Л/Т.

0.25 — 0.35 л/ха

Прскање биљака током интензивног пораста 2 или више пута са размаком од најмање 10-14 дана између третмана. Потрошња радног раствора: 150-300 Л/Ха.

Препарат треба користити у смеши резервоара са хербицидима и у фази почетка формирања и ширења лисне розете.

За биљке мака, фаза почетка формирања лисне розете једна је од најважнијих и током овог периода Реликт-Р треба користити у комбинацији са пестицидима због смањења нежељених ефеката.

Вишегодишње траве

0.2 — 0.4 л/ха

Прскање биљака током интензивног пораста 2 или више пута са размаком од најмање 10-14 дана између третмана. Потрошња радног раствора: 150-300 Л/Ха.

Употреба Реликта-Р у пролећном периоду или после жетве трава подстиче развој земљишне ризосфере и подстиче развој корена и нових коренских длачица.

Мелиорација земљишта

3 — 8 л/ха

За усева чији се жетвени остаци лакше разграђују (грашак, пшеница, јечам итд.), потрошња препарата је 3-5 литара по хектару.

За усева са жетвеним остацима који се слабије разграђују (репица, кукуруз, шећерна репа, сунцокрет итд.) потрошња препарата је 5-8 литара по хектару.

Потрошња радног раствора 100-300 литара по хектару. Да би се појачао ефекат, може се користити у смеси резервоара са амонијум нитратом 1-3 кг по хектару.

Поврће и кромпир

Кромпир

20 мл / 20 л воде

Третирање кртола пре садње прскањем препарата радним раствором (количина радног раствора 10-15 Л/Т) или краткотрајним (30-40 сек.) потапањем мрежа са кртолама у припремљени раствор.

0.25 — 0.4 л/ха

Прскање биљака током интензивног пораста. Потрошња радног раствора 150-300 Л/Ха.

Главне фенофазе: 1) када је биљка у фази циме 10-15см, 2) при појави пупољака, 3) у фази пуног цветања.

Кромпир је усев који добро реагује на хуминске киселине, самим тим оне побољшавају усвајање калијума из земљишта. Такође Реликт-Р смањује стресни ефекат пестицида и побољшава усвајање хранљивих материја из минералних ђубрива.

Краставац, парадајз, паприка

15 — 30 мл / 10-15 л воде

Потапање семена пре сетве 6-12 сати.

0.2 — 0.4 л/ха

Прскање биљака током интензивног пораста 2-6 пута са размаком од најмање 10-14 дана између третмана.

Особина хумата је да стимулише активан раст корена и поспешује укоренавање расада, што осигурава високу ефикасност усвајања хранљивих материја и оно резултује брзим опоравком биљака након брања смањује стресни ефекат пестицида, самим тим повећава принос 10 - 15%.

Такође, његова способност побољшања исхране корена посебно је важна током периода плодоношења. Биљке које воле топлоту третиране Реликтом Р мање реагују на промене дневних и ноћних температура, услед чега се повећава принос плодова који се могу продати на крају сезоне раста.

Шаргарепа

15 — 30 мл / 10 — 12 л воде

Потапање семена пре сетве 6-12 сати.

0.3 — 0.4 л/ха

Прскање биљака током интензивног пораста 2-3 пута са размаком од најмање 10-14 дана између третмана.

Главне фенофазе: 1) 2-4 права листа, 2) 4-6 правих листова, 3) почетак интензивног пораста.

Купусњаче: (кељ, карфиол, броколи...)

15 — 30 мл / 10 — 12 л воде

Потапање семена пре сетве 6-12 сати.

0.3 — 0.4 л/ха

Прскање биљака током интензивног пораста 2-6 пута са размаком од најмање 10-14 дана између третмана. Потрошња радног раствора 150-400 Л/Ха.

Технологија производње директном сетвом: 1) у фази 1-2 права листа, 2) у фази 4-6 листова, 3) у фази розете.

Технологија производње из расада: 1) заливање пре садње расада, 2) наредна 3 третмана поновити у размацима од 10 до 14 дана у односу на претходни корак.

1.25 — 2.5 л / 1000 л воде

Наводњавање корена системом кап по кап 2-6 пута током вегетације са размаком од најмање 10-14 дана између третмана.

Потрошња радног раствора: према норми наводњавања.

Употреба Реликта-Р током формирања главица купуса помаже и повећава отпорност биљака на болести.

Бундева, тиквице

15 — 30 мл / 10 — 12 л воде

Потапање семена пре сетве 6-12 сати.

0.3 — 0.4 л/ха

Прскање биљака током интензивног пораста 2-3 пута са размаком од најмање 10-14 дана између третмана.

Главне фенофазе: 1) 2-3 права листа, 2) цветање - почетак цветања, 3) период формирања плодова.

1.25 — 2.5 л / 1000 л воде

Наводњавање корена 2-4 пута током вегетације са размаком од најмање 10-14 дана. Потрошња радног раствора према норми наводњавања.

Технологија производње на отвореном пољу: 1) у фази 2-3 права листа, 2) цветање — почетак цветања, 3) период формирања плодова.

Технологија производње у заштићеном тлу: 1) заливање приликом садње расада, 2) наредна 3 третмана поновити у размацама од 10 до 14 дана у односу на претходни корак.

Лук: црни и бели

15 — 30 мл / 10 — 12 л воде

Потапање семена пре сетве 6-12 сати.

0.2 — 0.4 л/ха

Прскање биљака током интензивног пораста 2-4 пута са размаком од најмање 10-14 дана између третмана.

Главне фенофазе: 1) садња, 2) 1-2 права листа, 3) 2-4 права листа 4) 4-6 листова.

1.25 — 2.5 л / 1000 л воде

Наводњавање корена 2-4 пута током вегетације са размаком од најмање 10-14 дана. Потрошња радног раствора према норми наводњавања.

Уз поновљену употребу пестицида током гајења биљака, препоручује се примена Реликта-Р сваки пут са наношењем од 0,15-0,2 Л/Ха, како би се смањило хемијско оптерећење биљака.

Лиснато поврће, зачинско биље: (мирођија, першун, салата, рукола, босиљак...)

15 — 30 мл / 10 — 12 л воде

Потапање семена пре сетве 6-12 сати.

0.3 — 0.4 л/ха

Прскање биљака током интензивног пораста 2-3 пута са размаком од најмање 10-14 дана између третмана.

Главне фенофазе: 1) садња 2) наредних 2-4 третмана поновити у размацама од 10 до 14 дана у односу на претходни корак.

1.25 — 2.5 л / 1000 л воде

Наводњавање корена 2-4 пута током вегетације са размаком од најмање 10-14 дана. Потрошња радног раствора према норми наводњавања.

Ове културе карактерише интензиван пораст, за чије формирање је потребна довољна количина азота. Употреба Реликта-Р током гајења ових култура помаже повећању апсорпције азота вегетативним делом биљака, смањујући ризик од акумулације нитрата у њиховим листовима.

Патлиџан

15 — 30 мл / 10-15 л воде

Потапање семена пре сетве 6-12 сати.

0.2 — 0.4 л/ха

Прскање биљака током интензивног пораста 2-6 пута са размаком од најмање 10-14 дана између третмана.

Особина хумата је да стимулише активан раст корена и поспешује укореневање расада, што осигурава високу ефикасност усвајања хранљивих материја и оно резултује брзим опоравком биљака након брања смањује стресни ефекат пестицида, самим тим повећава принос 10 - 15%.

Такође, његова способност побољшања исхране корена посебно је важна током периода плодоношења. Биљке које воле топлоту третиране Реликтом Р мање реагују на промене дневних и ноћних температура, услед чега се повећава принос плодова који се могу продати на крају сезоне раста.

Воћне и јагодичасте културе

Јабучасто воће: (јабука, крушка, дуња...)

2 — 3 мл / 1.5 — 2 л воде

Потапање пре садње садница (приликом заснивања воћњака) са отвореним коренским системом 3-4 сата.

0.4 л/ха

Прскање биљака током интензивног пораста 3-5 пута са размаком од најмање 10-14 дана. Потрошња радног раствора 400 Л/Ха.

Третирање: 1) у фази пупољака, од 5 до 7 дана пре отварања истих, 2) када опадне више од 50% круничних листића, 3&4) 14 дана, односно 28 дана након другог третмана, 5) 20 дана пре бербе, 6) 5 дана након завршене бербе (за боље формирање и презимљавање родних пупољака за наредну сезону).

1.5 — 2.5 л / 1000 л воде

Наводњавање корена помоћу система кап по кап. Стопа потрошње Реликта-Р је од 6 до 9,5 Л/Ха. Потрошња радног раствора према стопи наводњавања.

Концентрација препарата је назначена у складу са садржајем хумуса у земљишту.

Први третман помаже повећању фертилности полена и повећава отпорност биљака на стрес на ниске температуре током периода цветања, што свеукупно доводи до боље оплодње. Други третман обезбеђује бољи почетни пораст плодова. Трећи и четврти третман Реликтом Р обезбеђује боље коришћење хранљивих материја услед интензивног пораста плодова. Пети третман обезбеђује накупљање, бољи квалитет и карактеристике (изглед, укус, боље чување) плода.

Вишња, трешња

2 — 3 мл / 1.5 — 2 л воде

Потапање пре садње садница са отвореним коренским системом 3-4 сата.

0.3 — 0.4 л/ха

Прскање биљака током интензивног пораста 3-5 пута са размаком од најмање 10-14 дана. Потрошња радног раствора 400 Л/Ха.

Третирање: 1) у фази пупољака, од 5 до 7 дана пре отварања истих, 2) 10 - 14 дана након завршетка цветања, 3&4) 14 дана, односно 28 дана након другог третмана.

Јагодичасто воће: (малина, купина, рибизла, боровница...)

2 — 3 мл / 1.5 — 2 л воде

Потапање пре садње садница 12-24 сата.

0.3 — 0.6 л/ха

Прскање биљака током интензивног пораста 3-5 пута са размаком од најмање 10-14 дана. Потрошња радног раствора 300-400 Л/Ха.

Третирање: 1) почетком интензивног раста лисне масе, 2) пре цветања, 3) након повезивања родних гранчица, 4) 14 дана након трећег третмана, 5) након бербе плодова (третман младих изданака доводи до побољшања њиховог презимљавања и повећање продуктивности садње у наредној сезони).

1.25 — 2.5 л / 1000 л воде

Наводњавање корена помоћу система кап по кап. Потрошња радног раствора према стопи наводњавања.

Јагоде

1.25 — 2.5 л / 1000 л воде

Наводњавање корена помоћу система кап по кап са размаком од најмање 10 до 14 дана. Потрошња радног раствора према стопи наводњавања.

Третирање: 1) након што презими на пролеће (након чишћења засада), 2) током цветања биљака, 3) 10 до 14 дана након другог третмана, у фази раста плодова, 4) по завршетку плодоношења.

Реликт-Р има доказану, високу ефикасност приликом садње садница јагода. Његова употреба омогућава боље укоренавање и стимулише раст коренских длачица. Бубрење биљака након плодова треба обавити пажљиво како би се спречило прекомерно стимулисање биљака. Прехрана у овом периоду доприноси успостављању већег броја цветних пупољака за следећу сезону и расту новог лисног апарата и кореновог система.

Грожђе

0.3 — 0.6 л/ха

Прскање биљака током интензивног пораста 3-5 пута са размаком од најмање 10-14 дана. Потрошња радног раствора 300-400 Л/Ха.

Третирање: 1) почетком интензивног раста лисне масе, 2) у фази 5-8 листова по усеву, 3) у тренутку формирања цвасти, 4) након цветања, са почетком интензивног раста бобица 5) 14 дана након четвртог третмана.

1.25 — 2.5 л / 1000 л воде

Наводњавање корена 3-5 пута са размаком од најмање 10-14 дана. Потрошња радног раствора према стопи наводњавања.

Хмељ:

2 — 3 мл / 1,5 — 2 л воде

Потапање пре садње садница 12-14 сати.

0.4 л/ха

Прскање биљака током интензивног пораста 3-5 пута са размаком од најмање 10-14 дана. Потрошња радног раствора 300-400 Л/Ха.

Третирање: 1) раст стабљика и развој лишћа у пролеће, 2) раст бочних ластара (висина изданка 2,2м-2,5м), 3) почетак цветања, 4) формирање шишарки, 5) технолошка зрелост шишарки.

Употреба Реликта-Р у смеши са уреом или АН-ом на листу, током вегетације, повећава ефикасност минералних ђубрива до 50%.

Орашasti плодови: (ораси, лешници, бадеми, маслине...)

2 — 3 мл / 1.5 — 2 л воде

Потапање пре садње садница са отвореним коренским системом 3-4 сата.

0.3 — 0.4 л/ха

Прскање биљака током интензивног пораста 3-5 пута са размаком од најмање 10-14 дана. Потрошња радног раствора 400 Л/Ха.

Третирање: 1) у фази пупољака, од 5 до 7 дана пре отварања истих, 2) 10 - 14 дана након завршетка цветања, 3&4) 14 дана, односно 28 дана након другог третмана.

Шљива, бресква, нектарина

1.25 — 2.5 л / 1000 л воде

Потапање пре садње садница.

Концентрација препарата је назначена у складу са садржајем хумуса у земљишту. Што је нижи садржај хумуса у земљишту, то већа концентрација препарата може бити у оквиру препоручене вредности.

0.3 — 0.6 л/ха

Прскање биљака током интензивног пораста 3-5 пута са размаком од најмање 10-14 дана. Потрошња радног раствора 300-400 Л/Ха.

Третирање: 1) у фази пупољака, од 5 до 7 дана пре отварања истих, 2) када опадне више од 50% круничних листића (почетак раста плода), 3&4) 14 дана, односно 28 дана након другог третмана, 5) када воће почне да добија боју.

Цитрусно воће: (лимун, наранџа, лимета)

2 — 3 мл / 1.5 — 2 л воде

Потапање пре садње садница са отвореним коренским системом 3-4 сата.

0.3 — 0.4 л/ха

Прскање биљака током интензивног пораста 3-5 пута са размаком од најмање 10-14 дана. Потрошња радног раствора 400 Л/Ха.

Третирање: 1) у фази пупољака, од 5 до 7 дана пре отварања истих, 2) 10 - 14 дана након завршетка цветања, 3&4) 14 дана, односно 28 дана након другог третмана.

Цветне и декоративне собне и баштенске биљке

Цвеће

20 — 30 мл / 15 — 20 л воде

Прскање биљака током интензивног пораста 3-5 пута са размаком од најмање 10-14 дана.

20 — 30 мл / 15 л воде

Потапање пре садње садница са отвореним коренским системом 3-4 сата. Наводњавање корена 2-6 пута са размаком од најмање 10-14 дана. Потрошња радног раствора: 3-10 Л/м².

Собно цвеће

20 — 30 мл / 10 л воде

Заливање биљака током периода њиховог активног раста једном за 10-15 дана, остатак времена једном за 1-1,5 месеци.

Трава

0.2 — 0.4 л/ха

Прскање биљака 3-6 пута током вегетације од почетка пролећног поновног раста са размаком од најмање 12-14 дана између примене препарата. Потрошња радне: течности 2-3 Л/ 100 м².

100 — 200 мл / 100 л воде

Заливање биљака 3-6 пута током вегетације од почетка пролећног поновног раста са размаком од најмање 12-14 дана између примене препарата..

Потрошња радног раствора према стопи наводњавања.

Примена Реликта-Р у периоду пролећног и пораста и пораста након кошења, подстиче стварање изданака обезбеђујући повећање отпорности травњака на стрес и естетске квалитете пејзажа.

Дрвеће, жбуње, грмови

0.2 — 0.4 л/ха

Прскање биљака 3-6 пута током вегетације од почетка пролећног поновног раста са размаком од најмање 12-14 дана између примене препарата. Потрошња радне: течности 2-3 Л/ 100 м².

3.5 — 4 л / 1000 л воде

Заливање биљака 3-6 пута током вегетације од почетка пролећног поновног раста са размаком од најмање 12-14 дана између примене препарата.. Потрошња радног: раствора према стопи наводњавања.

Примена Реликта-Р у периоду пролећног и пораста и пораста након кошења, подстиче стварање изданака обезбеђујући повећање отпорности травњака на стрес и естетске квалитете пејзажа.

Да би се спречило испирање активне материје у дубље хоризонте земљишта биљака препарат се додаје пред крај заливања да би остао у зони кореновог система.

Важно је уносити препарат пред сам крај наводњавања како би се спречило испирање препарата у дубље слојеве земљишта (испод ризосфере). Важно је да препарат буде у зони кореновог система.

Да би то учинили, препарат треба додати на крају наводњавања, израчунато на 2,5 Л/Ха - 2,5 Л хумата на 10 кубних метара воде, на 5 Л/Ха - 5 Л хумата на 20 кубних метара воде.

За личне помоћне парцеле:

30 — 50 мл / 2 — 3 л воде

Сви усеви - примена током припреме тла (орање, копање, растресање). Потрошња радног: раствора: 2-3Л / 100м².

15 — 30 мл / 10 — 12 л воде

Повртарство, цвеће и украсно воће и бобичасто воће - натапање корена пре сетве (садње) - семе: 6-12 сати, кртоле: 1-2 сата, луковице: 6-8 сати, сече и саднице: 14-24 сати, саднице са отвореним коренским системом: 3-4 сата.

20 — 30 мл / 15 — 20 л воде

Поврће, цвеће и украсно воће и бобичасто воће - фолијарно прихрањивање биљака током вегетације 2-6 пута. Потрошња радног: раствора: 1-2Л / 100м²; грмље и дрвеће 8-10Л / 100м².

15 — 25 мл / 10 л воде

Поврће, цвеће и украсно биље, воће и јагодичасто воће - храњење биљака у корену током вегетације (примена водом за наводњавање) 2-6 пута. Потрошња радног: раствора: 5-10 Л/м².

2.5 — 5 мл / 100 л хранљивог раствора

Поврће, цвеће и украсне културе (хидропонски метод гајења) — храњење биљака кореном (додавање хранљивог раствора) током сезоне раста.

Важно!

- Норме потрошње радног раствора за прехрану различитих пољопривредних култура су уобичајене.
- Овај производ се може користити појединачно или као мешавина у резервоару прскалице заједно са пестицидима као и са једнокомпонентим и комплексним минералним, макро и микро ђубривима.