

Da bi se sprečilo ispiranje aktivne materije u dublje horizonte zemljišta biljaka preparat se dodaje pred kraj zalivanja da bi ostao u zoni korenovog sistema.

Važno je unositi preparat pred sam kraj navodnjavanja kako bi se sprečilo ispiranje preparata u dublje slojeve zemljišta (ispod rizosfere). Važno je da preparat bude u zoni korenovog sistema.

Da bi to učinili, preparat treba dodati na kraju navodnjavanja, izračunato na 2,5 L/ha - 2,5 L humata na 10 kubnih metara vode, na 5 L/ha - 5 L humata na 20 kubnih metara vode.

Za Lične Pomoćne Parcele:

30 – 50ML / 2 – 3L VODE

Svi usevi - primena tokom pripreme tla (oranje, kopanje, rastresanje).

Potrošnja radnog rastvora: 2-3L / 100m².

15 – 30ML / 10 – 12L VODE

Povrtarstvo, cveće i ukrasno voće i bobičasto voće - natapanje korena pre setve (sadnje) - seme: 6-12 sati, krtole: 1-2 sata, lukovice: 6-8 sati, seče i sadnice: 14-24 sati, sadnice sa otvorenim korenskim sistemom: 3-4 sata.

20 – 30ML / 15 – 20L VODE

Povrće, cveće i ukrasno voće i bobičasto voće - folijarno prihranjivanje biljaka tokom vegetacije 2-6 puta.

Potrošnja radnog rastvora: 1-2L / 100m²; grmlje i drveće 8-10L / 100m².

15 – 25ML / 10L VODE

Povrće, cveće i ukrasno bilje, voće i jagodičasto voće - hranjenje biljaka u korenu tokom vegetacije (primena vodom za navodnjavanje) 2-6 puta.

Potrošnja radnog rastvora: 5-10 L/m².

2.5 – 5ML / 100L HRANLJIVOG RASTVORA

Povrće, cveće i ukrasne kulture (hidroponski metod gajenja) - hranjenje biljaka korenom (dodavanje hranljivog rastvora) tokom sezone rasta.