



Kupusnjače: (*repica, kamelina, uljna rotkva...*)

0.3 – 0.4 L/T

Dorada semena preparatom pre setve. Potrošnja radnog rastvora 10-20 L/t.

0.25 – 0.35 L/HA

Prskanje biljaka tokom intezivnog porasta 2 ili više puta sa razmakom od najmanje 10-14 dana između tretmana. Potrošnja radnog rastvora 150-300 L/ha.

Glavne fenofaze: 1) 2-4 prava lista, 2) formiranje lisne rozete, 3) formiranje mahuna.

Podsticanje razvoja korenovog sistema sadnica, istovremeno, obezbeđuje poboljšanje ishrane biljaka u ranim fazama razvoja. Relikt R podstiče klijavost i energiju klijanja semena, razvoj korenovog sistema biljke i istovremeno obezbeđuje bolju ishranu biljaka u ranim fazama razvoja.

Prihrana useva kupusnjače posebno je važna na proleće nakon prezimljavanja useva gde uz upotrebu našeg preparata biljka brže nastavlja intezivan razvoj korenovog sistema.

Zahvaljujući aktivnim komponentama preparata i helatnim svojstvima huminske i fulvinske kiseline, Relikt R se savršeno kombinuje i povećava efikasnost upotrebe vodno rastvorljivih đubriva kao što su amonijum sulfat, urea, AN, KAN itd. i poboljšava usvajanje hranljivih materija iz đubriva.