



Jabučasto Voće: *(jabuka, kruška, dunja...)*

2 – 3ML/ 1.5 – 2L VODE

Potapanje pre sadnje sadnica (prilikom zasnivanja voćnjaka) sa otvorenim korenskim sistemom 3-4 sata.

0.4 L/HA

Prskanje biljaka tokom intezivnog porasta 3-5 puta sa razmakom od najmanje 10-14 dana. Potrošnja radnog rastvora 400 L/ha.

Tretiranje: 1) u fazi pupoljaka, od 5 do 7 dana pre otvaranja istih, 2) kada opadne više od 50% kruničnih listića, 3&4) 14 dana, odnosno 28 dana nakon drugog tretmana, 5) 20 dana pre berbe, 6) 5 dana nakon završene berbe (za bolje formiranje i prezimljavanje rodni pupoljaka za narednu sezonu).

1.5 – 2.5L / 1000L VODE

Navodnjavanje korena pomoću sistema kap po kap. Stopa potrošnje Relikta R je od 6 do 9,5 L/ha. Potrošnja radnog rastvora prema stopi navodnjavanja.

Koncentracija preparata je naznačena u skladu sa sadržajem humusa u zemljištu.

Prvi tretman pomaže povećanju fertilnosti polena i povećava otpornost biljaka na stres na niske temperature tokom perioda cvetanja, što sveukupno dovodi do bolje oplodnje. Drugi tretman obezbeđuje bolji početni porast plodova. Treći i četvrti tretman Reliktom R obezbeđuje bolje korišćenje hranljivih materija usled intezivnog porasta plodova. Peti tretman obezbeđuje nakupljanje, bolji kvalitet i karakteristike (izgled, ukus, bolje čuvanje) ploda.